

DIFERENCIAS ENTRE ZONAS ENDÉMICAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y ZONAS CON ALTOS ÍNDICES DE CALOR.



Las zonas endémicas para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad Renal Crónica son los cantones donde las tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica son superiores al resto del país.

Según el Decreto Ejecutivo N° 39709-S, se han declarado 11 cantones como zonas para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad Renal Crónica:

A. Alajuela: Upala

B. Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Nandayure, La Cruz y Hojanca.



Las zonas con altos índices de calor son lugares donde las personas trabajadoras están expuestas a un mayor estrés térmico por calor.



Se establecen 4 niveles de riesgo para las personas trabajadoras que realizan labores al aire libre.

		Temperatura °C															
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Humedad Relativa (%)	40	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	45	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	50	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	55	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	60	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	65	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	70	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	75	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	80	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	85	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	90	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
	95	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow										
100	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow											

Medidas de Prevención y Protección según nivel de riesgo

● Nivel I
 ● Nivel II
 ● Nivel III
 ● Nivel IV



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE COSTA RICA



CSO CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL